

Kedves Páciens!

Szeretnénk felhívni a figyelmét egy sokakat érintő, de gyakran alábecsült és bizonyos esetekben kórházi ellátást igénylő betegsége: a pneumococcus baktérium által okozott **tüdőgyulladásra**. Fontos tudni, hogy a pneumococcus nemcsak tüdőgyulladást, hanem súlyos szövődményeket, például agyhártyagyulladást vagy véráramfertőzést is előidézhet.¹

A tüdőgyulladás a tüdő szöveteinek gyulladásos megbetegedése, amelyet többféle kórokozó is okozhat. Az egyik leggyakoribb és legsúlyosabb változatát a *Streptococcus pneumoniae* nevű baktérium okozza, közismert nevén pneumococcus. Ez a betegség különösen veszélyes lehet az idősekre, a kisgyermekekre, illetve azokra, akik valamilyen krónikus betegséggel élnek vagy legyengült az immunrendszerük.¹

Betegség tünetei:

•Nehézlégzés • Mellkasi fájdalom • Fáradtság • Láz, izzadás és hidegrázás •Köhögés, amely váladékképződéssel járhat. ¹

A 65 év felettieknél négyszer nagyobb eséllyel alakul ki szív- és érrendszeri betegség a tüdőgyulladás kórházi kezelése utáni egy hónapban, mint azoknál, akik nem kapták meg a fertőzést. ²

Fontos tudni: a betegség megelőzhető!

Magyarországon elérhető a pneumococcus elleni védőoltás, amely **különösen ajánlott:**

- 2 éves kor alatt és 50 éves kor felett mindenkinek
- A krónikus betegeknek, akik alapbetegségük miatt fogékonyabbak a súlyos pneumococcus fertőzésre: tüdő- (COPD, asztma), szív-, vese-, máj- és cukorbeteg, a gyengült vagy károsodott immunrendszerű betegek (pl. biológiai terápiában részesülők, daganatos betegségben, gyulladásos bélbetegségben szenvedők, szervátültetésen átesettek). ^{1,3}
- Dohányosoknak – életkortól, betegségtől függetlenül. ^{1,3}
- Belsőfül műtéten átesetteknek és a koponyasérülteknek. ^{1,3}
- Léphiányosoknak. ^{1,3}

Az oltás biztonságos és hatékony módja annak, hogy megvédjük magunkat és szeretteinket a súlyos szövődményektől.

Kérjük, konzultáljon kezelőorvosával, hogy megtudja, mekkora Önnél a pneumococcus okozta tüdőgyulladás kockázata és javasolt-e Önnek valamelyik ajánlott védőoltás felvétele.

Tegyen a megelőzésért – az egészség az egyik legnagyobb értékünk!

Referenciák:

1. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Egészségvonal, Pneumococcus fertőzés.
<https://egeszsegvonal.gov.hu/egeszseg-a-z/p-q/pneumococcusfertozes.html>. Utolsó megtekintés: 2025.05.23.
2. Corrales-Medina VF, Alvarez KN, Weissfeld LA, et al. Association Between Hospitalization for Pneumonia and Subsequent Risk of Cardiovascular Disease. *JAMA*. 2015;313(3):264–274. doi:10.1001/jama.2014.18229
3. Módszertani levél a 2025. évi védőoltásokról
https://nnk.gov.hu/attachments/article/2790/2025_evi_Vedooltasi_Modszer_tani_Level.pdf Utolsó megtekintés: 2025.05.23.
4. Prevenar 20 (korábban Apexxnar) szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben. Elérhető:
<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/prevenar-20#product-info> A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2025. április 24.

Anyaglezárás dátuma: 2025.06.17.

Prevenar 20 szuszpenziós injekció előretöltött fecskendőben: szuszpenziós injekció, adszorbeált pneumococcus polisaccharid konjugált vakcina (20-valens), amely a *Streptococcus pneumoniae* baktérium 20 típusa által okozott betegségek megelőzésére szolgál. Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen mellékhatás bejelentésével. A mellékhatások jelentésének módjairól a betegtájékoztató 4. pontjában (Mellékhatások bejelentése) talál további tájékoztatást.⁴

PP-PNR-HUN-0048 NNGYK engedélyszám: NNGYK/43327-4/2025

A jelen anyag a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 17. § (5) bekezdése szerinti egészségnevelési célú – az egészségügyi államigazgatási szerv által egyedileg engedélyezett védőoltási programot népszerűsítő kampány része.

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft.

1123. Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park "A" épület, Tel.: +36 1 488 3700, www.pfizer.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!